


# 簡単衛生管理・しっかり除菌 ネオクロールスティック

## 特長

- ①リネン類や食器、入浴施設で高い除菌効果が得られます。
- ②速やかに溶解します。
- ③顆粒タイプの個別包装なので、取扱いが簡単です。
- ④長期保存が可能です。
- ⑤顆粒タイプなので飛び散りや液ハネが無く、衣類の脱色などの心配はありません。



成分:ジクロロイソシアヌル酸Na



次亜塩素酸

## 包装状態

1包 1.6g  
2ℓ に溶解して0.05% 濃度

- ・スターターセット 100包/袋+専用容器  
¥5,000- (税別:岩手県内送料込み)
- ・リフィルセット 100包/袋  
¥4,500- (税別:岩手県内送料込み)

★ネオクロールスティックを水に溶かして発生する次亜塩素酸が、各種菌を殺菌します。  
★pHが弱酸性のため、皮膚への刺激が少なく済みます。

## 使用上の注意

本製品は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取扱いの際には次の点ご注意ください。

## 警告



酸化性 有害性

- 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素などとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- 酸、アルカリ、脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)、油脂類その他可燃物と直接触れないようにしてください。
- 本商品は飲み込むと有害です。
- 目や呼吸器を刺激します。
- 使用中に目にしみたり、気分が悪くなった時は、直ちに離れ、洗眼し、新鮮な空気のところへ移動し、使用を中止してください。



混合禁止 必ず換気



子供注意 水ぬれ注意

- ①火気、熱(機械室、ボイラー室など)、直射日光などを避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ②金属を腐食しますので使用する容器などは、樹脂製の材質をお選びください。
- ③取り扱い時は手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
- ④火災の原因になりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないでください。処分する場合は販売店にお問い合わせください。
- ⑤皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに払い落とし、水で十分に洗い流してください。
- ⑥目、鼻、口へ入らないようにしてください。もし目に入った場合は、擦らないで15分以上洗浄してください。
- ⑦火災時は現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は大量の水をかけてください。
- ⑧子供の手の届かないところに保管してください。
- ⑨保存の際、水ぬれには注意してください。(容器内に水、湯が入らないようにお取り扱いください。)
- ⑩商品が変色する恐れがありますので、入浴剤などの香料が配合された他の薬剤を近くに置かないでください。

# さまざまな場所でかんたんに除菌

ネオクロールスティックは、専用容器半分(1リットル)の水に1包投入すると(0.05%=500ppm)の有効塩素濃度になります。

## 使用例 1

### 食器類や、調理器具の除菌、洗浄、 トイレの便座やドアノブ、手すり、床等の拭き取りに

使用量の目安：5リットル（専用容器2杯半）の水に1包（200ppm）

使用方法：

- ・食器類や調理器具の除菌、洗浄の場合、溶解液に対象物を浸漬します。浸漬後、水で十分すすいでください。
- ・拭き取りの場合は手袋をして、雑巾などを溶解液に浸して絞り、ご使用ください。

**注意**

※銀製品や錆びるおそれのある物には使用しないでください。  
※ご使用の際は手袋などの保護具を着用してください。



## 使用例 2

### 衣服、リネン類、まな板、ふきんの除菌・洗浄

使用量の目安：2リットル（専用容器1杯分）の水に1包（500ppm）～2包（1,000ppm）

使用方法：

- ・リネン、衣服の除菌には、汚物が付着している場合には水洗いで取り除き、溶解液に浸漬した後、洗濯してください。
- ・まな板、ふきんの場合、溶解液に浸漬した後、洗浄してください。

**注意**

※他の洗浄剤とは絶対に混ぜないでください。  
※色柄ものには使用しないでください。  
※ご使用の際には手袋などの保護具を着用してください。



## 使用例 3

### 便や嘔吐物で汚れた床の処理に


使用量の目安：1リットル（専用容器半分）の水に5包（5,000ppm）

使用方法：

- ・汚物を取り除いた後、溶解液で床を浸すように2回拭き取り、その後水拭きしてください。

**注意**

※ご使用の際はマニュアルなどで決められた保護具を着用してください。



## ●有効塩素濃度調整方法

0.02%・・・専用容器2杯半(5ℓ)の水に1包(1.6g)を溶かす

0.05%・・・専用容器1杯(2ℓ)の水に1包(1.6g)を溶かす

0.1%・・・専用容器半分(1ℓ)の水に1包(1.6g)を溶かす

0.5%・・・専用容器半分(1ℓ)の水に5包(8.0g)を溶かす

製造元



四国化成工業株式会社

幕張支社 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-B16 ☎(043)296-1665  
大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22-6 ☎(06)6380-4112  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-13-21 ☎(092)431-0116  
徳島工場 〒771-0288 福岡県板野郡北島町江尻1 ☎(088)698-4111(夜間・休日)  
(北島事務所)

販売店

株式会社アイシーシー・SPサポート  
〒020-0813  
岩手県盛岡市東山2丁目3-12  
☎019-651-0765  
<http://www.sp-sup.co.jp>